

Avertissements agricoles



Grandes cultures

Bulletin Technique n° 28 du 16 octobre 1989

Abonnement Annuel : 190 F

* COLZA :

- des parcelles très tardives encore exposées aux Grosses Altises
- des attaques locales de Noctuelles et de limaces

* MAIS :

- l'influence des façons culturales dans la lutte contre la Pyrale

** COLZA **

-----GROSSES ALTISES

* **SITUATION** : l'activité des Grosses Altises, très réduite actuellement en raison des températures basses et de l'humidité, peut reprendre dès que les conditions météorologiques s'améliorent.

Une grande partie des colzas a dépassé le stade "2 feuilles vraies" qui marque la fin de la période de sensibilité aux morsures. Cependant, des colzas très tardifs, dont la levée a pu être retardée par la sécheresse, n'ont pas atteint ce stade.

* PRECONISATION :

► Si votre colza n'a pas atteint le stade "2 feuilles vraies" : intervenez dès que vous observez 3 pieds sur 10 porteurs de morsures.

► Si votre colza a dépassé le stade "2 feuilles vraies" : veuillez à limiter le dépôt des pontes de Grosses Altises. Un traitement insecticide se justifie alors uniquement si vous comptez 30 captures cumulées en cuvette jaune.

-----CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

Le vol n'a pas commencé.



7374

-----NOCTUELLES DES MOISSONS

* **SITUATION** : plusieurs cas de fortes attaques de Noctuelles sont signalés, notamment dans le Bas-Rhin et dans la région de Mulhouse. Les chenilles (ou vers gris) ont une activité nocturne : elles sectionnent cotylédons ou jeunes feuilles provoquant un flétrissement des plantes.

* **PRECONISATION** :

En cas de forte attaque, pulvérisez une pyréthrinaïde à la tombée de la nuit (Decis CE à 0,3 l/ha, cyperméthrine à 30 g de matière active/ha, ...) ou bien épandez des appâts au semoir pneumatique (Sevin appâts, Dursban appâts, ...).

-----LIMACES

* **SITUATION** : des attaques graves sont observées dans certaines parcelles. Les fortes hygrométries des derniers jours ont favorisé l'activité des limaces. Les dégâts de limaces sont caractéristiques : les fibres végétales subsistent là où les feuilles ont été rongées.

* **CONFUSION POSSIBLE** : avec les dégâts des larves Tenthredes de la Rave. Ces fausses chenilles gris foncé marquées de 2 bandes noires dorsales sont très voraces. Elles consomment elles aussi les feuilles en délaissant l'épiderme (faux pour les Noctuelles).

* **PRECONISATION** : maintenez votre surveillance.

** MAIS **

-----PYRALE

* **SITUATION** : les attaques de Pyrale du Maïs se réduisent d'année en année dans beaucoup de secteurs. A tel point que dans certains cas, la rentabilité des traitements chimiques est discutable en maïs grain. Le Maïs doux, plus attractif, a souffert de rares attaques fortement limitées par les traitements.

Dans les deux situations, les méthodes culturales sont une garantie de réduire encore le niveau des populations les années prochaines.

* **PRECONISATION** :

► Effectuez un broyage soigné après récolte : cette technique permet de détruire mécaniquement les chenilles hivernantes qui ne sont pas descendues dans le pivot laissé en terre à la récolte. Son efficacité est donc meilleure si elle est précoce.

► Ne négligez pas le labour : les chenilles présentes dans les pivots, enterrées suite à un labour profond à l'automne, ne pourront sortir au printemps suivant. Le vol s'en trouvera là aussi réduit.